



命を守るシートベルト

石川県のシートベルト着用状況

(令和6年実施 警察庁・JAF合同シートベルト着用状況調査結果より)

運転席

一般道路 **99.0%**
高速道路 **100%**



助手席

一般道路 **94.3%**
高速道路 **99.5%**

後部座席

一般道路 **35.5%**
高速道路 **76.1%**

後部座席シートベルト着用率は、全国平均より低いです！
後部座席シートベルト非着用で事故に遭うと…



！ 後部座席でシートベルト非着用の危険性 ！

車内で全身強打！

前席の人が被害！



車外放出！



後部座席シートベルト非着用時の致死率（死傷者数に占める死者数の割合）は着用時と比べ、
高速道路で、約25.9倍
一般道路で、約3.3倍
高くなります。（令和元年～令和5年全国合計）



病気などやむを得ない理由がある場合を除き、**助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければなりません！**
(道路交通法第71条の3)

チャイルドシートの正しい使用方法

6歳以上のこどもであっても体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない場合は、ジュニアシート等を使用しましょう。

- ☑ こどもの成長に合わせ、体格に合うものを使用する。
- ☑ 設置の際には座席に確実に固定する。
- ☑ なるべく後部座席で使用する。

※助手席エアバック装備の場合など、やむを得ず助手席に設置する場合は、座席をできるだけ後ろに下げ、前向きに固定する。



妊娠中の正しいシートベルトの正しい着用方法

シートベルトの正しい着用は、交通事故の被害から母体や胎児を守ります。ただし、健康保持上、シートベルトの着用が適当かどうかを医師に確認しましょう。

- ☑ 腰ベルト・肩ベルト共に着用する。
- ☑ 肩ベルトは、首にかからないようにする。
- ☑ 肩ベルトは胸の間を通し、腹部の側面に通す。
- ☑ 腰ベルトは腹部のふくらみを避け、骨盤のできるだけ低い位置を通す。

